

# НУКС ВОМИКА С15 (Буарон)

## Владелец регистрационного удостоверения:

**VOIRON** (Франция)

## Контакты для обращений:

**БУАРОН** (Франция)

Код АТХ: **V30** (Не присвоен)

## Лекарственная форма

Гранулы гомеопатические С15: пенал 4 г со счетчиком гранул

рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – *Бессрочно* Дата перерегистрации: 13.04.18

## Форма выпуска, упаковка и состав препарата Нукс вомика

<i>Гранулы гомеопатические</i>	Разведение
Нукс вомика (Nux vomica)	С15

*Вспомогательные вещества:* сахароза, лактоза.

4 г - пеналы со счетчиком гранул (1) - пачки картонные.

**Клинико-фармакологическая группа:** Гомеопатический монокомпонентный препарат растительного происхождения

**Фармако-терапевтическая группа:** Гомеопатическое средство

## Фармакологическое действие

Nux vomica изготавливается из высушенных семечек рвотного ореха, дерева с непадающей листвой родом из Юго-Восточной Азии.

Химический состав:

- жирные кислоты;
- полисахариды;
- иридоиды, среди которых логанозид;
- алкалоиды (3%), главным образом стрихнин (45% алкалоидов) и бруцин – основные активные вещества; также присутствуют следы малых алкалоидов - колубрина, вомицина, новацина.

Стрихнин и бруцин – специфические антагонисты глицина, постсинаптическое действие которого они блокируют.

## Показания препарата Нукс вомика

### *Ключевые симптомы для назначения препарата*

- гиперчувствительность к свету, шуму, запахам, малейшим прикосновениям;
- гиперчувствительность к холоду (ощущение холода, озноб на прохладном воздухе);
- судороги икроножных мышц и пальцев ног;
- колики с приступами тошноты, которые не приводят к рвоте;
- склонность к спастическим процессам;
- запор;

- кровоточащий геморрой;
- вздутие живота.

### **Основные случаи клинического применения**

#### *Расстройства поведения*

- раздражительность, вспыльчивость, агрессивность, поведение, связанное с различными типами зависимости;
- спазмы, гиперчувствительность к шуму, запахам, прикосновениям, общая рефлекторная гипервозбудимость;
- укачивание;
- бессонница (сложно заснуть, затем пробуждение около 3 ч утра – в ситуации переутомления; мышление настолько ускоренное, что больной с трудом засыпает и просыпается усталым).

#### *Гастроэнтерология*

- диспепсия:
  - с обложенным языком, покрытым желтовато-белым налетом в задней части;
  - приступы тошноты, облегчаемые рвотой;
  - диарея в виде повторяющихся необильных жидких испражнений;
  - запоры с позывами на дефекацию, не приводящими к стулу;
  - головная боль.
- зудящий, болезненный геморрой (улучшение наступает от сидячих холодных ванн);
- лечение и предупреждение избыточного эпизодического употребления продуктов и напитков, содержащих алкоголь;
- младенческие колики, сопровождающиеся спазмами ЖКТ, от которых ребенок плачет.

#### *Оториноларингология*

- острые риниты, возникающие после переохлаждения (простуды), с многократным чиханием во время пробуждения, с водянистой ринореей, сопровождающейся зудом в носу или заложенностью носа и сухостью слизистых оболочек; улучшение при ринорее происходит на открытом воздухе;
- аллергические риниты, периодические или не периодические, с чиханием "залпами" при пробуждении, при вставании с постели или в течение дня.

#### *Инфектология*

- фебрильные состояния с дрожью, напоминающие псевдомаларийный приступ (пациент дрожит при малейшем движении или как только раскрывается, не может согреться); сильная жажда в момент скачков температуры.

Сочетание характерного острого ринита и ломящих болей (ночные боли в пояснице, при которых больному приходится садиться в кровати, чтобы перевернуться) делает Нукс вомика эффективным лекарственным средством для лечения гриппозного синдрома.

#### *Кардиология*

- спазматическая артериальная гипертензия; Нукс вомика также назначается в случаях, когда АД остается нестабильным, несмотря на лечение гипотензивными средствами.

#### *Прочие показания*

- патология, возникающая по причине интоксикации (алкоголь, кофе, табак, возбуждающие средства, лекарственные средства);
- головные боли, мигрень у пациентов, проявляющих свойства чувствительного типа;
- бронхоспазм с ночными приступами около 3 ч ночи;
- люмбаго с ночным обострением, при котором пациенту трудно перевернуться в постели;
- задержка мочи и послеоперационный цистит с позывами, которые не приводят к мочеиспусканию.

### **Режим дозирования**

Сублингвально.

Гранулы необходимо рассасывать во рту за 30 мин до еды или через 60 мин после еды.

**Детям от 0 до 3 лет** гранулы предварительно разводят, встряхивая, в 10-15 мл воды комнатной температуры и дают выпить.

**Оптимальное количество на один прием - 5 гранул.**

Для определения разведения, кратности и длительности приема необходима консультация врача.

### **Побочное действие**

До настоящего времени не описаны.

### **Противопоказания к применению**

- индивидуальная чувствительность к препарату;
- непереносимость лактозы.

### **Особые указания**

Режим дозирования и кратность приема определяется врачом.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 3 дней, а также при появлении побочных реакций следует обратиться к врачу.

### **Передозировка**

До настоящего времени информация о случаях передозировки не поступала.

### **Лекарственное взаимодействие**

При лечении препаратом Нукс вомика возможно применение иных лекарственных средств.

### **Условия хранения препарата Нукс вомика**

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света и влаги месте, вдали от электроприборов при температуре 15-25°C.

### **Срок годности препарата Нукс вомика**

Срок годности - 5 лет.

### **Условия реализации**

Препарат отпускается без рецепта.

### **Контакты для обращений**

**БУАРОН** (Франция)



### **Представительство в России**

### **ООО "Буарон"**

127006 Москва

Долгоруковская ул. 7, эт. 11

Тел.: (495) 956-08-10

Факс: (495) 956-08-14

E-mail: [info@boiron.ru](mailto:info@boiron.ru)

<http://www.boiron.ru>