

КАЛЬКАРЕА ФЛУОРИКА С15 (Буарон)

Владелец регистрационного удостоверения:

[BOIRON](#) (Франция)

Контакты для обращений:

[БУАРОН](#) (Франция)

Код АТХ: [V30](#) (Не присвоен)

Лекарственные формы

Калькареа флуорика	Гранулы гомеопатические С5: пенал 4 г со счетчиком гранул
	рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 - <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18
	Гранулы гомеопатические С9: пенал 4 г со счетчиком гранул
	рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 - <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18
	Гранулы гомеопатические С15: пенал 4 г со счетчиком гранул
	рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 - <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18
	Гранулы гомеопатические С30: пенал 4 г со счетчиком гранул
	рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 - <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18

Форма выпуска, упаковка и состав продукта Калькареа флуорика

<i>Гранулы гомеопатические</i>	Разведение
КАЛЬКАРЕА ФЛУОРИКА (CALCAREA FLUORICA)	С15

Вспомогательные вещества: сахароза, лактоза.

4 г - пеналы со счетчиком гранул (1) - пачки картонные.

Клинико-фармакологическая группа: [Гомеопатический монокомпонентный препарат минерально-химического происхождения](#)

Фармако-терапевтическая группа: [Гомеопатическое средство](#)

Фармакологическое действие

Фторид кальция используется в измеряемых дозах в лекарственных препаратах общепринятой медицины:

- для лечения нарушения минерального обмена, слабости связок, сосудистых патологий

Показания препарата Калькареа флуорика

Ключевые симптомы для назначения препарата

- нарушения минерального обмена;
- кариес зубов и патология эмали;
- дефициты, остеопения, остеопороз или, напротив, утолщение периоста, остеофитоз, экзостоз;
- слабость связок и ослабление поддерживающих тканей,
- опущение внутренних органов,
- варикозное расширение вен, сосудистые опухоли;
- инфильтрация и уплотнение лимфоидной ткани и эндокринных желез.
- Дерматозы с образованием трещин и растрескиванием кожи (вторичный симптом), хрупкие и толстые ногти.

Основные случаи клинического применения

1. Ревматология

- Дистрофия роста (сколиоз, болезнь Осгуда-Шлаттера, болезнь Шейерманна) в дополнение к ортопедическому лечению.
- Боль как при артрите с остеофитами.
- Тенденция к развитию остеопороза после наступления менопаузы, особенно у пожилых пациентов.
- Повторные растяжения связок, рецидивирующий люмбаго.
- Перерождение ладонного апоневроза (контрактура Дюпюитрена).
- Альгодистрофия.

2. Гинекология

- Доброкачественное уплотнение молочных желез, яичников или матки.
- В дополнение к упражнениям на укрепление мышц промежности

3. Флебология

- Боли, вызванные варикозным расширением вен ног.
- Варикозный гиподерматит.

4. Пульмонология

- Расширенные бронхи. Калькареа флуорика (*Calcarea fluorica*) назначают в комбинации с препаратами от бронхиальной гиперсекреции.

5. Эндокринология

- Узлы в щитовидной железе или зоб, не требующие хирургического лечения

6. Дерматология

- Заболевания кожи и покровов тела у чувствительных типов.

Режим дозирования

Сублингвально.

Гранулы необходимо рассасывать во рту за 30 мин до еды или через 60 мин после еды.

Детям от 0 до 3 лет гранулы предварительно разводят, встряхивая, в 10-15 мл воды комнатной температуры и дают выпить за 30 мин до еды или через 60 мин после еды.

Оптимальное количество на один прием - 5 гранул.

Для определения разведения, кратности и длительности приема необходима консультация врача.

Побочное действие

До настоящего времени не описаны.

Противопоказания к применению

- индивидуальная чувствительность к препарату;
- непереносимость лактозы.

Особые указания

Режим дозирования и кратность приема определяется врачом.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 3 дней, а также при появлении побочных реакций следует обратиться к врачу.

Передозировка

До настоящего времени информация о случаях передозировки не поступала.

Лекарственное взаимодействие

При лечении препаратом Калькареа флуорика возможно применение иных лекарственных средств.

Условия хранения продукта Калькареа флуорика

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света и влаги месте, вдали от электроприборов при температуре 15-25°С.

Срок годности продукта Калькареа флуорика

Срок годности - 5 лет.

Условия реализации

Препарат отпускается без рецепта.

Контакты для обращений

[БУАРОН](#) (Франция)



BOIRON

Представительство в России

ООО "Буарон"

127006 Москва, Долгоруковская ул. 7,
эт. 11

Тел.: (495) 956-08-10; Факс: (495)
956-08-14