

ЦИКАДЕРМА® (CICADERMA)

зарегистрировано и произведено
BOIRON (Франция)

ФОРМА ВЫПУСКА, СОСТАВ И УПАКОВКА

◇ *Мазь для наружного применения гомеопатическая* однородная, от желтого до желто-оранжевого цвета, с характерным запахом.

	10 0 г
вазелиновый экстракт из смеси трех видов свежих растений <i>Calendula officinalis</i> (календула лекарственная), <i>Hypericum perforatum</i> (зверобой продырявленный), <i>Achillea millefolium</i> (тысячелистник) в соотношении 20:10:10	97 г
<i>Ledum palustre</i> МТ (багульник болотный, матричная настойка)	1.5 г
<i>Pulsatilla</i> МТ (прострел, матричная настойка)	1.5 г

По 30 г – в алюминиевую тубу, покрытую изнутри эпоксифенольным лаком, запечатанную алюминием, с завинчивающейся полиэтиленовой крышкой. Каждую тубу вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку с заклеивающимся по бокам «язычком».

НОМЕР И ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

П N009792-250422

АТХ

V03AX: Прочие лекарственные препараты

ФТГ

Гомеопатическое средство

КФГ

Гомеопатический препарат, применяемый наружно



ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено входящими в его состав компонентами.

ФАРМАКОКИНЕТИКА

Данные о фармакокинетике препарата Цикадерма® не предоставлены.

ПОКАЗАНИЯ

- ожоги 1-2 степени;
- поверхностные раны (мелкие порезы, трещины, ссадины);
- укусы насекомых.

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

Наружно.

Детям в возрасте от 1 года и взрослым следует наносить мазь на предварительно обработанную рану 1-2 раза/сут, в случае необходимости наложить повязку.

Длительность применения не должна превышать 7 дней.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Возможны аллергические реакции.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата;
- открытые и инфицированные раны;
- мокнущий дерматит;
- противопоказано нанесение на слизистые оболочки;
- детский возраст до 1 года.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ

Применение препарата при беременности и в период лактации возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Необходимо проконсультироваться с врачом, если после нескольких дней лечения не отмечено улучшение.

Не использовать для приема внутрь.

В период применения препарата следует избегать ультрафиолетового облучения.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора т.п.).

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Срок годности - 3 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Препарат отпускается без рецепта.

Производитель

БУАРОН, 2, авеню де л'Уэст Лионнэ,
69510 Мессими, Франция

Место производства

БУАРОН, 2, авеню де л'Уэст Лионнэ,
69510 Мессими, Франци

Представитель в России/организация, принимающая претензии потребителей

ООО «Буарон», Москва,
Ул. Долгоруковская д.7
Тел. (495) 956 08 10,
факс (495) 956 08 14